507.45
G33D6

DORIANA

Supplemento agli

ANNALI DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE "G. DORIA,,

GENOVA

Vol. I - N. 31 20 - X - 1952

LAMIAIRES NOUVEAUX DE LA COLLECTION DU MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE, GENOVA

(*Coleoptera, Cerambycidae*)

par le Dr. STEPHAN BREUNING

C'est grâce à l'obligeance des Messieurs les Docteurs C. Alzona et F. Capra que j'ai eu la possibilité d'étudier un lot de Longicornes parmi lesquels j'ai relevé cinq nouvelles formes. Les types se trouvent au Museo Civico di Storia Naturale di Genova.

Cereopsius sexnotatus Thoms. m. **niasicus** nov.

Se distingue de la forme typique par le dessin élytral: la tache prémédiane est élargie pour former une bande transversale, bande qui n'atteint pas tout à fait la suture; la tache postmédiane garde sa dimension, la tache préapicale par contre est très réduite.

Type un ♂ de l'Ile de Nias: VIII-1886, leg. Modigliani.

Phrynetopsis thomensis Jord. ssp. **principis** nov.

Comme la forme typique, mais les taches élytrales sont jaune blanchâtre au lieu de jaune d'ôcre. Dans la moitié antérieure de l'élytre ainsi que sur le pronotum se trouvent en outre aussi de petites taches noirâtres, assez nettes.

Type un ♂ de l'Ile Principe: Roca Infante Don Henrique, V-1901, leg. Fea.

Tetraglenes somaliensis sp. nov.

Comme *phantoma* Gerst., il en diffère par une taille plus avantageuse, les joues quatre fois plus longues que les lobes inférieurs des yeux, le pronotum presque deux fois plus long que large, à ponctuation

SMITHSONIAN
OCT 26 1954

moins fine, ainsi que par les élytres, à ponctuation un peu moins dense. et étirés au sommet en un lobe sensiblement plus court.

Noir, revêtu de pubescence blanchâtre, sans marbrures. Articles antennaires deux à onze couverts de pubescence gris foncé.

Type de Somalie: Belet-Amin (Giuba), IV-1923, leg. Patrizi.

Obereopsis insularis sp. nov.

Très allongé. Les antennes manquent complètement. Lobes inférieurs des yeux cinq fois plus longs que les joues (♂). Front à peine aussi large qu'un de ces lobes. Ponctuation sur la tête et le pronotum très dense et très fine, cependant un peu moins fine sur le front. Pronotum aussi long que large, ses côtés droits. Ecusson triangulaire. Elytres très allongés, faiblement tronqués au sommet (l'angle apical marginal obtus), à ponctuation très dense et peu fine, les points alignés dans les trois quarts antérieurs. Fémurs postérieurs atteignant le milieu du troisième segment abdominal.

Jaune rougeâtre, couvert d'une très fine pubescence jaunâtre. Une assez grande tache brune, vague, de chaque côté dans la partie latérale du pronotum. La marge apicale de l'élytre, le métasternum, les métépisternes et l'abdomen, à couleur fondamentale et à pubescence brun foncé. La moitié apicale des fémurs postérieurs, les tibias postérieurs et les premiers articles des tarses postérieurs d'un brun assez foncé. La partie préapicale des fémurs intermédiaires, les tibias intermédiaires et les tarses intermédiaires, à coloration fondamentale brun rougeâtre.

Longueur: 8 mm. Largeur: 1 mm. ½.

Type un ♂ de l'Ile Fernando Poo: Musola, 500-800 m. alt., 1-III-1902, leg. Fea.

Neonitocris Alzonai sp. nov.

Très allongé. Antennes à peu près d'un tiers plus longues que le corps entier (cassées au neuvième article chez l'unique exemplaire), le scape mince, le troisième article de la longueur du quatrième ou de l'un des articles suivants, sensiblement plus long que le scape. Lobes inférieurs des yeux deux fois et demie plus longs que les joues (♂). Front un peu plus large qu'un de ces lobes (♂). Ponctuation sur la tête et le pronotum extrêmement fine et peu dense. Pronotum aussi long que large, faiblement étranglé et transversalement déprimé avant la base et après le bord antérieur, très faiblement arrondi sur les côtés, pourvu de cinq petites bosses discales. Ecusson semicirculaire. Elytres très allon-

MUSEUM PARIS

gés, très faiblement rétrécis dans la partie médiane, ensuite très faiblement élargis dans la partie préapicale et étroitement échancrés au sommet (les angles sutural et marginal étirés en épines), à ponctuation très dense et assez grossière dans les trois quarts antérieurs où les points sont alignés, plus fine et plus serrée dans le quart apical.

Jaune rougeâtre, revêtu d'une fine pubescence jaunâtre. Elytres noirs, couverts d'une très fine pubescence brun noir, exception faite de l'extrême base et de la région humérale, et ornés d'une tache postscutellaire dorée longitudinalement oblongue, en commun à la suture. Les deux tiers postérieurs du métasternum sauf le long de la ligne médiane, les tibias postérieurs, les tibias antérieurs et intermédiaires sauf à la base et les premiers articles de tous les tarses, brun foncé. Les trois premiers articles antennaires et la moitié basilaire du quatrième noirs, le restant du quatrième article et les articles cinq à neuf à coloration fondamentale rouge et couverts de fine pubescence jaunâtre.

Longueur : 15 mm. Largeur : 2 mm. ½.

Type un ♂ d'Uganda : Entebbe, 1907, leg. C. Berti.